

جراحی سنگ کیسه صفرا چیست ؟

نوعی جراحی برای برداشتن کیسه صفرا و مجاری صفراوی است که در پزشکی به ان کله سیستکتومی می‌گویند. نقش کیسه صفرا و مجاری صفراوی ان است که صفرا را غلیظ کرده و در زمان مناسب وارد روده می‌کنند، که این اسیدهای صفراوی در هضم چربی شرکت دارند. در صورت انسداد مجراء و عدم دفع این اسیدهای صفراوی بیماری سنگ کیسه صفرا به وجود می‌آید و به این نوع عمل برداشت کیسه صفرا و مجاری صفراوی می‌گویند.

علت بروز و افراد پر خطر :

افراد خانه نشین و بی حرکت
دیابتی ها
افراد مسن
افراد چاق
سیگاری ها

صرف قرص ضد حاملگی
صرف کلو فیبرات ها (محصولات ضد چربی خون)

اتئی بیوتیک ها مثل سفتریاکسون
عدم مصرف آب کافی در شباهه رو

نکات شایع :

درد خفیف تا شدید در بالای شکم
تب ولرز
تهوع واستفراغ
یرقان
درد شدید منتشره که زمان ان بالای ۳۰ دقیقه طول بکشد
و نیاز به مسکن داشته باشد .

انواع سنگ کیسه صفرا :

ERCP

آندوسکوپی از مجاری صفراوی بعد از تزریق ماده حاجب می‌باشد.

علت جراحی و برداشتن کیسه صفرا :

انسداد و خوب کار نکردن صفرا
انسداد دیگر اندامها
سرطان کیسه صفرا و سنگ کیسه صفرا
بعد از برداشت کیسه صفرا کار ان را کبد انجام می‌دهد و صفارایی که در کبد ساخته شده وارد روده کوچک می‌شود.

علائم بعد از جراحی

درد شکمی ، تهوع ، اسهال

علت جراحی و برداشتن کیسه صفرا :

۱. متعادل تغهداشتن وزن بدن
۲. جلوگیری از کاهش سریع وزن
۳. ورزش کردن
۴. عدم مصرف دخانیات و الکل
۵. عدا نخوردن طولانی مدت یک راه بروز سنگ است
۶. افزایش مصرف داروهای ضد بارداری یکی از راه های تشکیل سنگ کیسه صفراست
۷. عدم مصرف غذاهای دارای کلسترول
۸. مصرف آب فراوان

الف : کلسترولی (۷۵%)

علت: رسوب تدریجی بلورهای کلسترول به دلیل بارداری های متعدد ، چاقی ، بیماری روده باریک وغیره مثل سن بالا و کاهش وزن سریع و ناگهانی

ب : رنگدانه ای (۲۵%)

علت: به خوبی شناخته شده نیست و در بیماران کبدی و خونی بیشتر است . رژیم غذایی در آن نقشی ندارد .

راهنمای تشخیص :

علامت بالینی : درد بعد از مصرف غذای چرب سونوگرافی شکم : ۸ ساعت قبل نباید غذا مصرف شود . تصویر برداری از کیسه صفرا و مجاری

درمان :

دارو درمانی : در مورد سنگ کوچک به کار می‌رود و نیاز به زمان دارد . بعد از قطع دارو مجدداً ایجاد می‌شود ERCP و اسفتکترومی : تخلیه سنگ های مجاری صفراوی

نهایاً بعد از عمل جراحی برای برداشتن کیسه صفرا لاپاراسکوپی : ایجاد چند سوراخ در روی پوست در زمانی که نمی‌توان مجاری صفرا را تخلیه کرد

جراحی : برداشت سنگ کیسه صفرا + کیسه صفرا

جراحی باز : برش بزرگتر (برداشتن کیسه صفرا + سنگ داخل مجراء

مراقبت‌های بعد از جراحی :

لباس تنگ نپوشید تا محل جراحی زودتر خوب شود
حافظت پوست از نور خورشید
صرف زیاد آب
در صورت ترشح زرد یا قرمز به پزشک مراجعه شود .
(احتمال عفونت)

به مقدار کافی بخوابید
رزیم کم چرب برای کاهش التهاب .

تجذیه مفید در سنگ کیسه صفراء :

چای ، فیبر غذایی ، آب ، سیر ، زرد آلو ، گلابی ، انجیر ، لیمو ،
نارگیل ، انکور


غذاهای مضر برای بیماران دچار سنگ کیسه صفراء :

تخم مرغ ، شیر و لبنیات ، پرتقال ، لویا ، گندم ، قهوه ، پیاز ،
ذرت ، آجیل ، جو ، کاکائو ، شیرینی و شکر ، گوشت قرمز


غذاهای تسکین دهنده درد بیمار :

خیار و آب ان ، چغندر ، چای

مرکز آموزشی درمانی ۵ آذر گرگان



برداشتن کیسه صفراء
و خارج نمودن
سنگ کیسه صفراء



خیابان پنج آذر، جنب آذر ششم ، آدرس: گرگان

تلفن مرکز: 017-3115

وب سایت بیمارستان:

<https://goums.ac.ir>

گلستان: بهیاب سایت وب

<https://golestanbehyab.ir>